

OPMERKINGEN

- Niet gebruiken als de fles beschadigd is.
- Desinfecteer uw handen en draag handschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het gebruik van desinfectiemiddelen en medische hulpmiddelen.
- Als u Tristel DUO OPH voor de eerste keer gebruikt, druk dan twee tot vier keer op de pomp om deze te activeren.
- Reinig de medische hulpmiddelen grondig voordat u ze desinfecteert. De aanwezigheid van achtergebleven verontreiniging vermindert de werkzaamheid van elk desinfectiemiddel. Volg het ziekenhuisprotocol en de instructies van de fabrikant van het medisch hulpmiddel.
- Niet gebruiken op zachte metalen of roestvrij staal van mindere kwaliteit.
- Deze poster moet gebruikt worden in combinatie met de gebruiksaanwijzing (IFU), het productetiket, de veiligheidsinformatiebladen (SDS) en de instructies van de fabrikant van het hulpmiddel.
- Uitsluitend bestemd voor gebruik door zorgprofessionals.

GEBRUIKSAANWIJZING



Plaats een droog doekje in de palm van uw hand en breng 2 doses Tristel DUO OPH aan.



Plaats het hulpmiddel rechtstreeks in het schuim en gebruik het doekje om ervoor te zorgen dat alle oppervlakken van het hulpmiddel volledig bedekt zijn.

Opmerking: Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg volgens de lokale voorschriften. Niet hergebruiken.



Zorg ervoor dat het hulpmiddel gedurende een minimale contacttijd van 30 seconden nat blijft. Laat aan de lucht drogen.



Spoel het medisch hulpmiddel af met water van geschikte kwaliteit.

Opmerking: Droog en bewaar het medisch hulpmiddel volgens de protocollen van de instelling om schade of herbesmetting te voorkomen.